

MARBOCYL® P 5 mg, 20mg, 80mg

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Marboflokscyna	5 mg/tabletkę
Marboflokscyna	20 mg/tabletkę
Marboflokscyna	80 mg/tabletkę

WŁAŚCIWOŚCI

Marboflokscyna jest syntetyczną substancją bakteriobójczą należącą do grupy fluorochinolonów. Jej działanie jest oparte na hamowaniu aktywności DNA - gyrazy, co prowadzi do zaburzenia syntezy DNA przez bakterie. Marboflokscyna ma szerokie spektrum działania, obejmujące bakterie Gram-dodatnie (w szczególności *Staphylococcus spp.* i *Streptococcus spp.*), Gram-ujemne (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Shigella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Brucella canis*) i mykoplazmy (*Mycoplasma spp.*).

WSKAZANIA LECZNICZE

Psy:

- powierzchowne (wyprzenia, liszajec, zapalenia mieszków włosowych) lub głębokie (ropne zapalenie skóry, czyrak i zapalenie tkanki łącznej) zapalenia skóry wywołane przez bakterie wrażliwe na działanie marboflokscyny
- zakażenia układu oddechowego wywołane przez bakterie wrażliwe na działanie marboflokscyny
- zakażenia układu moczowego wywołane przez bakterie wrażliwe na działanie marboflokscyny

Koty:

- zakażenia skóry (wrzód, ropień, ropowica) wywołane przez bakterie wrażliwe na działanie marboflokscyny
- zakażenia układu oddechowego wywołane przez bakterie wrażliwe na działanie marboflokscyny

PRZECIWSKAZANIA

Nie stosować u psów w wieku poniżej 12 miesięcy, a u psów bardzo dużych ras (takich jak dog niemiecki, owczarek berneński, owczarek francuski - briard, Bouvier, mastif) w wieku poniżej 18 miesięcy

Nie stosować u kotów w wieku poniżej 16 tygodni.

Nie stosować u zwierząt w ciąży i karmiących

Nie stosować przy zaburzeniach we wzroście chrząstek oraz u zwierząt z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko obserwuje się wymioty, niewielką zmianę konsystencji kału, wzmożone pragnienie, przemijające pobudzenie niewielkiego stopnia. Objawy te ustępują samoistnie po zakończeniu leczenia i nie wymagają interwencji lekarza weterynarii

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies, kot

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA

Do podania doustnego. Podawać 1 raz dziennie w dawce:

Marbocyl® P 5 mg	1 tabletka/2,5 kg m.c. (2 mg marbofloksacyny/kg m.c.)
Marbocyl® P 20 mg	1 tabletka/10 kg m.c. (2 mg marbofloksacyny/kg m.c.)
Marbocyl® P 80 mg	1 tabletka/40 kg m.c. (2 mg marbofloksacyny/kg m.c.).

Tabletki podawać bezpośrednio doustnie lub razem z karmą.

Psy:

Zakażenia skóry	Produkt podawać przez co najmniej 5 dni; leczenie może być przedłużone w razie konieczności do 40 dni
Zakażenia układu oddechowego	Produkt podawać przez co najmniej 7 dni; leczenie może być przedłużone w razie konieczności do 21 dni
Zakażenia układu moczowego	Produkt podawać przez co najmniej 10 dni; leczenie może być przedłużone w razie konieczności do 28 dni

Koty:

Zakażenia skóry	Produkt podawać przez 3-5 dni
Zakażenia układu oddechowego	Produkt podawać przez 5 dni

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Nie stosować przy stwierdzonej oporności na chinolony (oporność krzyżowa).

Lek może być stosowany tylko w infekcjach wywoływanych przez drobnoustroje, których wrażliwość potwierdzono antybiogramem oraz w przypadku oporności na inne chemioterapeutyki. Produkt nie może być stosowany do leczenia infekcji o mniejszym nasileniu

Niskie pH moczu może hamować skuteczność marbofloksacyny.

Stwierdzono, że fluorochinolony powodują uszkodzenia chrząstek stawowych u rosnących psów i dlatego stosując lek u młodych zwierząt należy zwracać uwagę na dawkowanie. Znane są też inne działania niepożądane wspólne dla fluorochinolonów. Należy zachować ostrożność stosując lek u psów i kotów z rozpoznaną padaczką. Osoby o znanej nadwrażliwości na fluorochinolony powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Należy używać rękawiczek w przypadku kontaktu z produktem (dzielenie, podawanie tabletek). W przypadku kontaktu z produktem należy umyć ręce. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie

Badania na ciężarnych szczurach i królikach nie wykazały żadnych działań ubocznych w czasie ciąży. Niemniej jednak bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone u psów i kotów.

Równoczesne podawanie wraz z lekiem preparatów zawierających kationy glinu, wapnia,

magnezu i żelaza może prowadzić do zmniejszenia wchłaniania marbofloksacyny.
Należy zmniejszyć dawkę teofiliny w przypadku podawania jej równocześnie z marbofloksacyną.

Nie stosować z makrolidami i tetracyklinami z uwagi na możliwy antagonizm

U psów nie obserwowano objawów przedawkowania przy stosowaniu marbofloksacyny przez 13 tygodni w dawce do 6 mg/kg m.c. Zastosowane dawki 6 mg marbofloksacyny na kg m.c. nie prowadziło do zmian w obrębie chrząstek stawowych ani u młodych ani u dorosłych psów. U młodych kotów nie obserwowano objawów przedawkowania przy stosowaniu marbofloksacyny w dawce do 10 mg na kg m.c.

Jedynie bardzo wysokie dawki (powyżej 2000 mg/kg) mogą prowadzić u zwierząt do wystąpienia objawów nerwowych (np. depresja, konwulsje). W takim przypadku należy zastosować leczenie objawowe.

OPAKOWANIA

Marbocyl[®] P 5 mg - blister 10 tabletek

Marbocyl[®] P 20 mg - blister 10 tabletek

Marbocyl[®] P 80 mg - 2 blistry po 6 tabletek

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

VETOQUINOL S.A. Magny-Vernois B.P. 189 70200 LURE Francja

Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów

Wielkopolski Polska

Vetoquinol SA Magny-Vernois, BP 189 70200 Lure Francja

Nr pozwolenia:

Marbocyl P 5 mg:1152/01, Marbocyl P 20 mg: 1159/01, Marbocyl P 80 mg: 1158/01